

ZUVERLÄSSIGE HÄNDEDESINFEKTION

Spitacid™

Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Spitacid™ ist ein zuverlässiges und wirksames Händedesinfektionsmittel für den täglichen Einsatz.

- ▶ In der Routine einsetzbar
- ▶ Breites Wirkspektrum
- ▶ Wirksam gegen Coronaviren



Spitacid™

Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Breites Wirkspektrum: · Bakterizid (inkl. TB) · Levurozid · Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) · Wirksam gegen Rotaviren · Wirksam gegen Coronaviren Kurze Einwirkzeiten: 90 Sek. bei der chirurgischen Händedesinfektion	Sichere Händedesinfektion in allen Bereichen der Klinik und Praxis. In der Routine einsetzbar. Zeitsparende, praxiserhaltende Anwendung

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

HÄNDEDESINFEKTION	EINWIRKZEIT	LISTUNG
Spitacid™ unverdünnt in die trockenen Hände einreiben. Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden.		
Hygienische Händedesinfektion gemäß DGHM (EN 1500)	30 Sek.	VAH/RKI Bereich A
Hygienische Händedesinfektion mit tuberkulozider Wirkung (TB)	2 x 30 Sek.	
Chirurgische Händedesinfektion gemäß DGHM (EN 12791)	90 Sek.	VAH
Prüfung gemäß RKI-Empfehlung 1/2004 (DVG 2008)		
Begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV, HCV)	30 Sek.	IHO
Rotavirus	30 Sek.	IHO
Zusätzliche Wirksamkeiten		
Begutachtete Wirksamkeit gegen Noroviren (MNV)**	30 Sek.	IHO
Begutachtete Wirksamkeit gegen Noroviren (MNV) (EN 14476)***	30 Sek.	IHO

* Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatvirus für Hepatitis-C Virus) und Vakziniavirus.
 ** Gutachten Henkel AG & Co. 21.12.2009
 *** Gutachten Dr. Jochen Steinmann 24.04.2011

- 1 Anwendung nur auf trockenen Händen.
- 2 Uhren und Ringe abnehmen, Fingernägel sollten kurz und unlackiert sein.
- 3 Nehmen Sie ausreichend Händedesinfektionsmittel (soviel wie in eine hohle Handfläche passt).
- 4 Hände vollständig benetzen mit besonderem Augenmerk auf Fingerkuppen, Nagelfalz und Daumen.



- ▲ Mindestens 30 Sekunden einreiben (ggf. Einwirkzeiten auf dem Etikett beachten)
- ▲ Händewaschen bitte nur bei sichtbarer Verschmutzung

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ecolab-Allee 1
 40789 Monheim am Rhein
 +49 (0) 2173-599-1900
 www.ecolabhealthcare.de

DESINFIZIEREN. WASCHEN. PFLEGEN.

EINSATZBEREICHE

Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Spitacid™ Taschenflasche	50 x 100 ml	30 953 90 PZN 002 040 85
Spitacid™ Spenderflasche	24 x 500 ml	30 953 70 PZN 038 349 58
Spitacid™ Spenderflasche	12 x 1 L	30 953 50 PZN 023 997 04
Spitacid™ Kanister	5 L	30 954 10 PZN 018 494 53

Spitacid™
 Lösung zur Anwendung auf der Haut. **Zusammensetzung:** 100 g Spitacid™ enthalten: Wirkstoffe: 46,0 g Ethanol (96% MEK-vergäbl), 27,0 g 2-Propanol (Ph. Eur.), 1,0 g Benzylalkohol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30%, Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph.Eur.), Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Nicht zur Antiseptik großflächiger, offener Wunden geeignet. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe, Linalool, D-Limonen, Geraniol, Citronellol, Citral, 2-Benzylidenheptanal. **Nebenwirkungen:** Kontaktreaktionen der Haut sind möglich. Linalool, D-Limonen, Geraniol, Citronellol, Citral, 2-Benzylidenheptanal können allergische Reaktionen hervorrufen. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich; nicht in Flammen sprühen, Flammpunkt (nach DIN 51755): 21 °C; vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen. Die Anwendung von Arzneimitteln in der Schwangerschaft sollte grundsätzlich immer unter besonderer Vorsicht erfolgen.

ZU RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN LESEN SIE DIE PACKUNGSBEILAGE UND FRAGEN SIE IHREN ARZT ODER APOTHEKER.

Stand: 08/2020

Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein.